



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Ocvlvs, Hoc Est: Fvndamentvm Opticvm

Scheiner, Christoph

Freiburg i. B., 1621

Cap. IX. Refractio radij ex Aqueo humore in Crystallinum.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-71258](#)

etiam si ipse rarer existat, quā Crystallinus aut Aqueus? cum Viureus humor longissimo interuallo aērem spissitudine antecedat? Deinde quā fieret, ut tam densus esset Vitreus, ut binas refractions in Cornea & Chrystallino factas compensaret? Igitur sicut hoc argumentum prodensitate Vitrei humoris allatum per dictam instantiam eneruatur, ita raritas ē contrario, aut densitas & qualis multum stabilitur.

REFRACTIO RADII VISIBILIS ex humore Aqueo, in Araneam & hu- morem Chrystallinum.

CAPUT IX.

Dicendum radium ex Aqueo in anteriores Crystalli membranas (duæ n. sunt minimū ut dictū l. I. p. i. c. 5. p. 10.) appulsum refringi ad perpendicularē. Descendat radius DG, ex humore Aqueo in Araneam anteriorem HGI; quia ergo Crystallinus densior est humor Aqueo, refractio fieret ad perpendicularē GC, ideoq; radius DG, in radium GK, refractione inflectetur.

Ceterum, quod de Arachnoide assertum est, idem de extrema humoris Crystallini superficie, totaque illius profunditate iure merito est accipendum. Conuenit inter omnes Autatores, tam Opticos, quam Medicos & Physicos, Araneam eiusdem diaphanitatis, densitatis & raritatis cuius humor Crystallinus sit, existere. Vnde cum etiam homocentrica sint, recte concluditur, eodem modo radium visibilem in illis refringi.

REFRACTIO RADII VISIBILIS ex humore Crystallino in Vitreum.

CAPUT X.

Suppono iterum ex omnium vnanimi doctrina, Membranam humoris Vitrei Hyaloidem dictam, eiusdem densitatis esse, cuius ipse humor Vitreus existat.

Dicen-