



Ocvlus, Hoc Est: Fvndamentvm Opticvm

Scheiner, Christoph

Freiburg i. B., 1621

Cap. XI. Si humor Vitreus est formale visus organum, res eadem obtutu
uno simul & semel simplex & multiplex apparebit; quod tamen est
impoßibile.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-71258](#)

nis præpoller, suffocatis penitus radijs antecedentibus? quare in statione remota præpollent radij antecedentes, suffocato penitissimè concursu communi: qui tamen Vitreo humori (si videntes ipse est) necessario inest, uti & radij anteriores. Atque ex his partim datis & suppositis ex aduersarij mente, partim ex rei veritate manifestis, demonstratum etiam esto, obiectum unum in statione remota semper appariturum plura, si humor Vitreus esset formale visus organum. Id quod erat demonstrandum,

SI HVMOR VITREVS EST FOR-
male visus organum, res eadem per plura
foramina conspecta, appetet simul
simplex simul multiplex.

CAPUT XI.

Probatum est enim cap. 9. in statione remota rem semper visum iri simplicem; & ostensum est modò cap. 10. in eadem statione rem semper videri multiplicem; igitur in eadem statione res eadem semper simplex & semper multiplex videtur; igitur simul & semel una & multa appetet. Quod erat probandum. Aliter. In statione media, res appetet simplex, teste experientia; at qui in hac ipsa statione in humore Vitreo radij secundum foraminum multitudinem mutuo dissident, ut fusè ostensum c. 9. & alias sæpe in toto hoc opere eluiscit: ergo per ipsos res visui multiplicabitur. Quare in statione media res eadem simul & semel simplex & multiplex apparebit. Quod erat ostendendum,

SI HVMOR VITREVS EST FOR-
male visus organum, res eadem per plura fo-
ramina conspecta, videbitur simul situ
recto, simul euerso; aut semper
alterutro horum tantum.

CAPUT XII.

Quia