



Ocvlvs, Hoc Est: Fvndamentvm Opticvm

Scheiner, Christoph

Freiburg i. B., 1621

Cap. XV. Quæst. 12 . Quare semiclausis ciliis distinctius videmus?

[urn:nbn:de:hbz:466:1-71258](#)

nascentur, donec in singula axes opticum inuehat, mora in qua-
rendo aliquanta intercedat. In magna ergo oculi dilatatione spe-
cies omnes utcumque debiles & confusæ Retinam insident, & sic
minuta sensum vix mouent; in parva, ubi axis Opticus potissimum
dominatur, tempus intercedit, donec species illius rei cum axe
optico concurrat. Et sic parva antissa, difficulter reperiuntur, &c.

CAPUT XV.

Quare rem palpebris non nihil corrugatis, & con-
niuenti quasi oculo, distinctius videmus,
quam planè aperto?

QVia radij refracti, & lux nimia specierum nouera (diluit eni-
cas, ut sola oculum possideat) hoc modo excluduntur, & re-
liquæ imagines ordinatus & mundus in Retinam depinguntur
ut patet experientia foraminis in lamella. &c.

CAPUT XVI.

Quare in candelis accensis procul visis plurimas
quasi nigræ maculæ aut foramina
apparent?

QVia vel in Cornea & eius humectatione, vel in Aquo, aut
in Crystallino, seu denique in ipso tunicae Retinæ fundo
insident aliqui pori, vel bullæ, aut maculæ, seu denique ho-
terogenea quædam portiunculæ alicuius dispositio, quæ tales um-
bras & lacunas in lumen apparterent transmittit. Hoc autem ita
esse experieris abstersione vel frictione oculi, mutabuntur namque
aliquot hiatus; quod si qui statim manserint, attribues id temperie
oculi innatae. Non esse autem illos nigricantes vel umbras vel la-
cunas vel in vel ab obiecto, hinc certo erudiaris, quod ipsæ oculo
in faciem quamlibet conuerso, aspectui eodem modo obuersentur;
ex quo impossibile est, eas in ignem coniungere: & quod alias ostendit finis.