



Ocvlus, Hoc Est: Fvndamentvm Opticvm

Scheiner, Christoph

Freiburg i. B., 1621

Cap. XVIII. Quæst. 15. Quare adhibita lente conuexa à Myopibus res
eminus nebulosa, comminus clara videtur?

[urn:nbn:de:hbz:466:1-71258](#)

signari posse videntur, quod vinum multum spiritus tam animales quam vitales augeat; illi tunicas & humores oculi distendunt, quo sit ut Crystallinus globosior redditus communem basin ante Retinam finiat & imaginem in multis dispersiat; hi copia vint aucti per laterales radios in Retinam allatos obiectum sentiunt, eo quod ibidem in communem quandam annularem basin concurrant. Sobris varia oculorum humectatio radios etiam in diversas imagines solet distinguere; sed & naturalis Crystallini globositas, & spirituum visoriorum temperies ad hanc rem multum facit. Hoc certum in hisce casibus eas rerum imagines, quæ medullum humoris Crystallini peragunt, in formale visus organum, quod Retina est, exiguum quid posse, sed solas laterales in Retina picturas sentiri, quæ quidem circum circa in eadem efformarentur, si supercilium planè apertum esset; nunc autem quia id plerūque aliquam pupillæ portionem obtagit, speciei amplitudini ex ea parte in Retina tantundem decedit; & hinc secundum latitudinem, nō autem altitudinem geminatur, veletiam triplicatur aut quadruplicatur; quia totius pupillæ capacitas secundum utrumque oculi angulum semper patet. Signum huius evidens est hoc; quod, si oculum una cum capite flectas, ut alterius angulorum sursum specter, rem sursum & deorsum multiplicè aspicias. Et sic alteri etiam questionis membro satis factū esto.

CAPUT XVII.

Quare Myopes adhibito specillo conuexo, omnia paulò remotiora per nebulam, vicinissima clarè vident?

Qvia basis communis obiectorum remotorum per duas lentes breuiatas, Retinam non assequitur; vicinorum producitur, tandemq; plenè apprehendit.

CAPUT XIX.

Quare aliqui causis adhibitis specillis omnia per nebulam, & cum dolore oculorum vident?

Quia